



เปิดรับลงทะเบียน

เมื่อทำหมันสุนัข-แมวจรจัด และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ศาลาวัดเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายน 2566

ช่องทางลงทะเบียน



ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต.เกาะลอยบางหัก



Facebook : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต.เกาะลอยบางหัก



Line : ลงทะเบียนทำหมัน



หลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อแจ้งลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นำสัตว์มา

2. จำนวนสัตว์ที่ต้องการลงทะเบียนเข้ารับบริการ



ทำหมันจำนวนจำกัด 100 ตัว

(รวมสุนัขและแมวจรจัด ที่วัดและโรงเรียน)



ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่จำกัด

ให้งดน้ำ-อาหารสัตว์ อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง

สัตว์ต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วย ไม่เป็นสัตว์ หรือผสมมาแล้ว

ไม่รับทำสุนัข-แมว บ้านคู่

โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาวัดเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

มาเตรียมตัวสัตว์ก่อนทำหมันกันเถอะ

1. สัตว์ต้องงดน้ำและอาหารมาอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง โดยวิธีล่ามหรือขังไว้
 - ยาสลบจะทำให้สัตว์อาเจียน อาหารที่อาเจียนออกมาจะไปติดอยู่ที่หลอดลม ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้
2. สัตว์ต้องต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปี
 - สัตว์ที่มีอายุเยอะแนะนำให้ทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์ เพราะต้องตรวจเลือดดูเรื่องสุขภาพก่อน
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วย ไม่เป็นสัด หรือผสมแล้ว
 - สัตว์ที่ป่วยต้องรักษาให้หายก่อน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด
 - ส่วนสัตว์ที่เป็นสัด หรือผสมมาแล้ว เส้นเลือดจะขยายใหญ่และมาเลี้ยงบริเวณมดลูกมาก สัตว์จะเสียเลือดขณะผ่าตัดเยอะ ทำให้เสียชีวิตได้
4. ไม่รับทำสุนัข-แมว พันธุ์
 - สัตว์มีภาวะซ็อกได้ง่ายกว่าสุนัข และแมวพันธุ์ไทย และสัตว์พันธุ์หน้าสั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. ฉีดวัคซีนเข็มแรก ในลูกสัตว์อายุ 2-3 เดือน

เข็มที่สอง ห่างกัน 1 เดือนหลังจากเข็มแรก

2. สัตว์ที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว ฉีดปีละ 1 เข็ม


3. งดอาบน้ำ 7 วันหลังฉีดวัคซีน เพราะอาจทำให้ไม่สบายได้

4. สังเกตอาการแพ้วัคซีน เป็นเวลา 30 นาที ถ้าสัตว์มีอาการผิดปกติ

ให้รีบไปพบสัตวแพทย์

5. หากรับวัคซีนกลับไปฉีดที่บ้าน ต้องนำกระดิกทึบแสงใส่น้ำแข็งมารับวัคซีน

6. หากไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทันที ให้รีบนำวัคซีน ใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดา



วิธีดูแลหลังผ่าตัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง



- 1 สัตว์ที่ยังสลบอยู่ควรจัดให้นอนในท่าที่ตัวเหยียดตรง คอไม่พับงอ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการหายใจของสัตว์
- 2 อย่าให้นอนพื้นเย็น ให้หาผ้าหรือกระดาษลังปูรองให้สัตว์นอน เพื่อไม่ให้อุณหภูมิสัตว์ต่ำจนเกินไป
- 3 อย่ายัดลิ้นสัตว์กลับเข้าไป หมอดึงลิ้นออกมาเพื่อไม่ให้ลิ้นไปอุดที่หลอดลม
- 4 ในขณะที่สัตว์ยังรู้สึกตัวไม่เต็มที่ ยังเดินเซ ให้วางไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ตากแดด ไม่มีขงมีคม หรือบ่อน้ำ
- 5 ไม่ควรป้อนน้ำและอาหารในขณะที่สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวเต็มที่ อาหารอาจจะไปอุดที่บริเวณหลอดลมได้ ให้ตั้งอาหารและน้ำวางไว้ในที่ประจำ เมื่อสัตว์รู้สึกตัวเต็มที่ สัตว์จะลุกขึ้นไปทานเอง
- 6 ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ ,ใช้ยาทาแผลสด (เบตาดีน) ใส่แผลทุกวัน
- 7 ใส่เสื้อหรือปกคอกกันเลีย เพื่อไม่ให้สัตว์เลียหรือแทะแผล
- 8 ขังกรงหรือลามไว้ในขณะที่ยังไม่ตัดไหม เพื่อไม่ให้สัตว์ กระโดด ริ่งเล่น เพื่อป้องกันแผลแตก
- 9 หลังจากผ่าตัด 7-10 วัน หากแผลติดกันดีและแห้งสนิท ให้ตัดไหมได้
- 10 หากแผลแตก ติดเชื้อ หรือมีหนองไหลออกจากแผล ควรพาไปพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านท่าน

- ป.ล.1 ค่าซ่อมแผล แพงกว่าค่าทำหมัน เป็นคนใจร้ายสัก 1 สัปดาห์ ขังกรงและใส่ปกคอกกันเลียไว้
- ป.ล.2 เพศเมียสามารถใช้เศษผ้าตัดเส้นหลังผ่าตัดได้เอง เข้า youtube แล้วพิมพ์ว่า วิธีทำเสื้อแมวหลังผ่าตัด
- ป.ล.3 ก่อนหมอป้อนกลับสัตว์รู้สึกตัวแล้ว ปลอดภัยแล้ว แต่ถ้าเจ้าของละเลยเอาไปวางทิ้งไว้โดยไม่ดูแล สัตว์อาจจะตายได้ สละเวลาของท่านดูแลสัตว์เลี้ยงจนกว่า จะรู้สึกตัวดีเต็มที่ก่อน

