

7 ข้อควรรู้ โรคไข้เลือดออก ที่คุณอาจเข้าใจผิด



โรคไข้เลือดออก เป็นแล้วไม่เป็นซ้ำ

โรคไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์
ทุกคนสามารถเป็นไข้เลือดออกซ้ำ
ได้ถึง 4 ครั้ง และการเป็นครั้งที่ 2
มักจะมีอาการรุนแรงกว่าครั้งแรก



โรคไข้เลือดออก เกิดแค่ในฤดูฝน

ไม่ว่าฤดูไหน เมื่อยุงกัดก็มีโอกาส
เป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น และ
ไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะ

โรคไข้เลือดออก เป็นเฉพาะเด็ก

โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
พบได้ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเด็ก
หรือผู้ใหญ่สามารถป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น



แค่อาบน้ำชัง ไข่มุงก็ไม่มีแล้ว

ไข่มุงอยู่ในสภาพแห้งได้นานถึง 1 ปี
ตราบไต่ที่หลังการอาบน้ำทั้งแล้ว
ไม่ขัดขอบภาชนะ ไข่มุงก็พร้อมจะ
กลายเป็นยุงได้ เมื่อมีน้ำท่วมถึง
ไข่มุง



โรคไข้เลือดออก ติดต่อจากคนสู่คน ได้โดยตรง

โรคไข้เลือดออกจะติดต่อจากคน
สู่คนได้ ต้องมียุงลายเป็นพาหะ
นำโรค




ยุงลายออกหากิน ตอนกลางวัน

ยุงลายเพศเมีย มักออกหากิน
ในเวลากลางวัน พบมากในตอนเช้า
กับตอนบ่ายถึงเย็น หากยังไม่จี้
ยุงก็อาจบินออกมาในช่วงค่ำได้



เมื่อเป็นไข้เลือดออก สามารถกินยาแก้ปวด อะไรก็ได้

กลุ่มNSAIDs กลุ่มยาแก้ชักเสบ ที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ ใช้แก้ปวด ลดไข้ได้ แต่หากใช้
เมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออก จะทำให้มีอาการ
เลือดออกมากขึ้น และเสียชีวิตได้



3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค



เก็บบ้าน
เก็บกวาดบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายมีที่
เกาะพัก



 **มียุงลาย**
เป็นพาหะนำโรค

 **โรคไข้เลือดออก**

เก็บน้ำ
ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด
และสำรวจลูกน้ำยุง
ทุก 7 วัน



เก็บขยะ
คัดแยกขยะ
ทิ้งให้เรียบร้อย
โดยเฉพาะขยะ
ที่ขังน้ำได้



โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย



 **โรคติดเชื้อไวรัส**
ซิกา

เข้าฤดูฝน

ระวังแหล่งวางไข่ยุงลาย

แหล่งวางไข่ยุงลาย สามารถเกิดขึ้นได้จากภาชนะที่มีน้ำขัง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้ยุงลายมาวางไข่ได้



จานรอง
กระถางต้นไม้



แจกัน




ถังน้ำใช้



โอ่งน้ำ



อ่างบัว



พืชใบกาบ



เศษภาชนะ



ถังขยะ



ยางรถยนต์เก่า



หมั่นสำรวจและเทน้ำขังทิ้งทุก 7 วัน ช่วยลดการเกิดของยุงลาย และลดการป่วยจากโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย